

ВНИМАНИЕ! ПНЕВМОНИЯ!

ПНЕВМОНИЯ – инфекционное поражение легких, при котором альвеолы воспаляются и заполняются жидкостью, что приводит к нарушению обмена кислорода и углекислого газа в легких и к дыхательной недостаточности.

АЛЕКСАНДРА, мама 7-месячного Павлика

«Первые три дня мы лечились от ОРЗ, как говорил наш доктор. Но на четвертый день температура поднялась до 40 градусов. Ребенок задышался, кашлял. Температура не сбивалась. Я ничем не могла помочь своему малышу.

Я очень испугалась и вызвала «скорую».

В больнице нам сделали рентген и поставили диагноз: «пневмония». С ужасом вспоминаю несколько недель, проведенных в больнице под капельницами. Моему малышу кололи 4 раза в день антибиотики. Спасибо врачам, что спасли моего Павлика!»



ЧЕМ ОПАСНА ПНЕВМОНИЯ?^{1,2}

- ➔ Это одна из основных причин детской смертности. Ежегодно в мире от пневмонии погибает 1 миллион детей младше 5 лет.
- ➔ Из 200 детей один ребенок попадает в больницу до празднования своего пятилетия в связи с пневмококковой пневмонией.
- ➔ Пневмококковая пневмония является наиболее часто встречающейся формой воспаления легких у детей в возрасте до 2-х лет и самой частой формой этого заболевания, требующей госпитализации ребенка.
- ➔ Более половины всех пневмоний у детей первых лет жизни вызываются пневмококком.

Распространение пневмококка от человека к человеку происходит преимущественно воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также при контакте с предметами (контактный путь), которые соприкасались со слюной (ложки, чашки, игрушки и т.п.). Опасность заболеть существует круглогодично.²



ПРЕДОТВРАТИТЕ ПНЕВМОНИЮ У ВАШЕГО МАЛЫША – СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ!



СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА МАЛЫША:

Если Вашему малышу 2 месяца:³

двукратная вакцинация: в 2 месяца и в 4,5 месяца. Третью дозу (т.е. ревакцинацию) рекомендуется вводить на втором году жизни в 15 месяцев.

Если по какой-то причине Вы пропустили плановые прививки, рекомендуются следующие схемы:

Если Вашему малышу от 3-х до 11 месяцев:

двукратная вакцинация с интервалом не менее месяца между введениями. Третья доза (т.е. ревакцинация) рекомендуется на втором году жизни, не ранее чем через 2 месяца после введения второй дозы.

Если Вашему малышу от 12 до 23 месяцев:

двукратная вакцинация с интервалом между введениями не менее 2-х месяцев.

Если Вашему малышу от 2-х до 5 лет:

проконсультируйтесь с врачом.

Литература:

1. Pneumococcal vaccines WHO position paper--2012. Wkly Epidemiol Rec. 2012 Apr 6;87(14):129-44.
2. МР 3.3.1.0027-11 «Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой *Streptococcus pneumoniae*»
3. Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2014 г. N 125н.